แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดที่พบความเสี่ยงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ชนิดสถานประกอบการ	สถานประกอบการที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาโดยตรง และสถานประกอบการที่พบความเสี่ยงสูงมาก	สถานประกอบการที่อยู่ในรัศมีควบคุมความเสี่ยง (5 กิโลเมตร)	สถานประกอบการที่ไม่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา
ฟาร์มเลี้ยงสุกร	- ทำลายสุกรทุกตัวในฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูง	- บันทึกสั่งกักสุกรทุกตัวในฟาร์ม	- เฝ้าระวังทางอาการ 30 วัน
	- บันทึกสั่งกักสุกรทุกตัวในฟาร์มที่มีการเชื่อมโยงโดยตรง	- เก็บ Surface Swab โรงเรือนละ 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง/ทุก 2 สัปดาห์	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง
	- เก็บตัวอย่างเลือด ทุกโรงเรือนที่มีสุกรอยู่ โรงเรือนละ 15 ตัว	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง	
	- เก็บ Surface Swab โรงเรือนละ 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง/ทุก 2 สัปดาห์	- กรณีฟาร์ม non-GAP ให้เจรจาขอทำลายสุกรทุกตัว โดยขอใช้ราคาสุกรตามกฎหมายกำหนด	
	- กรณีฟาร์ม non-GAP ให้เจรจาขอทำลายสุกรทุกตัว โดยขอใช้ราคาสุกรตามกฎหมายกำหนด		
โรงฆ่าสุกร	**กรณีไม่พบความเสี่ยงสูงในโรงฆ่า**	**กรณีไม่พบความเสี่ยงสูงในโรงฆ่า**	**กรณีไม่พบความเสี่ยงสูงในโรงฆ่า**
	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง
	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรเข้าฆ่าทุกฟาร์ม ฟาร์มละ 5 ตัว จำนวน 4 ครั้ง/ทุกสัปดาห์	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรเข้าฆ่าทุกฟาร์ม ฟาร์มละ 5 ตัว จำนวน 2 ครั้ง/ทุก 2 สัปดาห์	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรเข้าฆ่าทุกฟาร์ม ฟาร์มละ 5 ตัว จำนวน 1 ครั้ง/ภายใน 30 วัน
	- ตรวจสอบข้อมูลฟาร์มที่เข้าฆ่าย้อนหลัง 2 สัปดาห์	- ตรวจสอบข้อมูลฟาร์มที่เข้าฆ่าย้อนหลัง 2 สัปดาห์	- ตรวจสอบข้อมูลฟาร์มที่เข้าฆ่าย้อนหลัง 2 สัปดาห์
	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง
	กรณีพบความเสี่ยงสูงในโรงฆ่า	**กรณีพบความเสี่ยงสูงในโรงฆ่า**	**กรณีพบความเสี่ยงสูงในโรงฆ่า**
	- ชะลอการนำสุกรเข้าฆ่า และทำความสะอาดโรงฆ่า (Big Cleaning)	- ชะลอการนำสุกรเข้าฆ่า และทำความสะอาดโรงฆ่า (Big Cleaning)	- ชะลอการนำสุกรเข้าฆ่า และทำความสะอาดโรงฆ่า (Big Cleaning)
	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน
	หากผลเป็นลบ ให้พิจารณานำสุกรเข้าฆ่าได้	หากผลเป็นลบ ให้พิจารณานำสุกรเข้าฆ่าได้	หากผลเป็นลบ ให้พิจารณานำสุกรเข้าฆ่าได้
	- ตรวจสอบข้อมูลฟาร์มที่เข้าฆ่าย้อนหลัง 2 สัปดาห์	- ตรวจสอบข้อมูลฟาร์มที่เข้าฆ่าย้อนหลัง 2 สัปดาห์	- ตรวจสอบข้อมูลฟาร์มที่เข้าฆ่าย้อนหลัง 2 สัปดาห์
	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง
สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร	**สถานที่จำหน่ายทุกแห่งที่รับซากจากโรงฆ่าที่พบความเสี่ยงสูง**	**สถานที่จำหน่ายทุกแห่งที่รับซากจากโรงฆ่าที่พบความเสี่ยงสูง**	**สถานที่จำหน่ายทุกแห่งที่รับซากจากโรงฆ่าที่พบความเสี่ยงสูง**
	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 4 ครั้ง/ทุกสัปดาห์	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง/ทุก 2 สัปดาห์	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณ/บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง/ทุก 2 สัปดาห์
ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์	- เก็บ Surface Swab รถบรรทุกอาหารสัตว์ 3 บริเวณ ได้แก่ ห้องโดยสาร/กระบะ/ล้อ	- เก็บ Surface Swab รถบรรทุกอาหารสัตว์ 3 บริเวณ ได้แก่ ห้องโดยสาร/กระบะ/ล้อ	- เก็บ Surface Swab รถบรรทุกอาหารสัตว์ 3 บริเวณ ได้แก่ ห้องโดยสาร/กระบะ/ล้อ
	บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 4 ครั้ง/ทุกสัปดาห์	บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง/ทุก 2 สัปดาห์	บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 ครั้ง/ภายใน 30 วัน
	- ตรวจสอบข้อมูลฟาร์มที่ซื้ออาหารจากร้านดังกล่าวย้อนหลัง 2 สัปดาห์	- ตรวจสอบข้อมูลฟาร์มที่ซื้ออาหารจากร้านดังกล่าวย้อนหลัง 2 สัปดาห์	- ตรวจสอบข้อมูลฟาร์มที่ซื้ออาหารจากร้านดังกล่าวย้อนหลัง 2 สัปดาห์
	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง	- หากพบสุกรป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดจำนวน 15 ตัวอย่าง