แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดที่พบความเสี่ยงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วัตถุประสงค์การเคลื่อนย้าย	สถานประกอบการที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาโดยตรง และสถานประกอบการที่พบความเสี่ยงสูงมาก	สถานประกอบการที่อยู่ในรัศมีควบคุมความเสี่ยง (5 กิโลเมตร)	สถานประกอบการที่ไม่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา
เคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์	**ฟาร์ม non-GAP**	**ฟาร์ม non-GAP**	**ฟาร์ม non-GAP/ฟาร์ม GAP สุกรขุน**
(ให้เคลื่อนย้ายได้หลังทำลายสุกรฟาร์มเสี่ยงสูง 2 สัปดาห์)	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรที่เข้าฆ่าทุกตัว (ผลเป็น **ลบ** ก่อนเคลื่อนย้าย)	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรที่เข้าฆ่าทุกตัว (ผลเป็น **ลบ** ก่อนเคลื่อนย้าย)	ฟาร์มที่น้อยกว่า 500 ตัว
	- แจ้งสัตวแพทย์พื้นที่ปลายทาง (ระบุ "การย้ายสุกรมีชีวิตเข้าโรงฆ่าสัตว์จากพื้นที่ต้นทางความ	- แจ้งสัตวแพทย์พื้นที่ปลายทาง (ระบุ "การย้ายสุกรมีชีวิตเข้าโรงฆ่าสัตว์จากพื้นที่ต้นทางความ	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุดที่จะเคลื่อนย้าย 15 ตัว
	เสี่ยงสูงมาก") และเข้าฆ่าภายในจังหวัดเท่านั้น	เสี่ยงสูงมาก") และเข้าฆ่าภายในจังหวัดเท่านั้น	ฟาร์มที่มากกว่า 500 ตัว
	- สัตวแพทย์ปลายทางเก็บ Surface Swab 1 ครั้ง (3 บริเวณ บริเวณละ 5 ตำแหน่ง) หลังสุกร	- สัตวแพทย์ปลายทางเก็บ Surface Swab 1 ครั้ง (3 บริเวณ บริเวณละ 5 ตำแหน่ง) หลังสุกร	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรโรงเรือนที่จะทำการเคลื่อนย้าย
	ชุดดังกล่าวเข้าฆ่าครบถ้วน	ชุดดังกล่าวเข้าฆ่าครบถ้วน	จำนวน 15 ตัว
	- สัตวแพทย์ปลายทางเก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุดดังกล่าวทุกตัว	- สัตวแพทย์ปลายทางเก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุดดังกล่าวทุกตัว	(ผลเป็น **ลบ** ก่อนเคลื่อนย้าย)
	ฟาร์มสุกรขุนหรือสุกรพันธุ์ปลดที่ได้รับรอง GAP	**ฟาร์มสุกรขุนหรือสุกรพันธุ์ปลดที่ได้รับรอง GAP**	**ฟาร์มสุกรพันธุ์ปลด**
	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรขุนที่เข้าฆ่า 15 ตัว (ผลเป็น **ลบ** ก่อนเคลื่อนย้าย)	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรขุนที่เข้าฆ่า 15 ตัว (ผลเป็น **ลบ** ก่อนเคลื่อนย้าย)	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรพันธุ์ปลดที่เข้าฆ่าทุกตัว
	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรพันธุ์ปลดที่เข้าฆ่าทุกตัว (ผลเป็น **ลบ** ก่อนเคลื่อนย้าย)	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรพันธุ์ปลดที่เข้าฆ่าทุกตัว (ผลเป็น **ลบ** ก่อนเคลื่อนย้าย)	(ผลเป็น **ลบ** ก่อนเคลื่อนย้าย)
	- แจ้งสัตวแพทย์พื้นที่ปลายทาง (ระบุ "การย้ายสุกรมีชีวิตเข้าโรงฆ่าสัตว์จากพื้นที่ต้นทางความ	- แจ้งสัตวแพทย์พื้นที่ปลายทาง (ระบุ "การย้ายสุกรมีชีวิตเข้าโรงฆ่าสัตว์จากพื้นที่ต้นทางความ	
	เสี่ยงสูงมาก") และเข้าฆ่าภายในจังหวัดเท่านั้น	เสี่ยงสูงมาก") และเข้าฆ่าภายในจังหวัดเท่านั้น	
	- สัตวแพทย์ปลายทางเก็บ Surface Swab 1 ครั้ง (3 บริเวณๆ ละ 5 ตำแหน่ง) หลังสุกรชุด	- สัตวแพทย์ปลายทางเก็บ Surface Swab 1 ครั้ง (3 บริเวณๆ ละ 5 ตำแหน่ง) หลังสุกรชุด	
	ดังกล่าวเข้าฆ่าครบถ้วน	ดังกล่าวเข้าฆ่าครบถ้วน	
	- สัตวแพทย์ปลายทางเก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุดดังกล่าว 5 ตัว	- สัตวแพทย์ปลายทางเก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุดดังกล่าว 5 ตัว	
เคลื่อนย้ายสุกรหย่านม/สุกรสาวทดแทนไปเลี้ยง	- ให้เคลื่อนย้ายได้หลังทำลายสุกรฟาร์มเสี่ยงสูง 2 เดือน	- ให้เคลื่อนย้ายได้หลังทำลายสุกรฟาร์มเสี่ยงสูง 1 เดือน	- ให้เคลื่อนย้ายได้หลังทำลายสุกรฟาร์มเสี่ยงสูง 1 เดือน
(ฟาร์ม GAP เท่านั้น)	- เกษตรกรยื่น ร.1 ต่อสัตวแพทย์ต้นทางก่อนเคลื่อนย้าย 3 สัปดาห์	- เกษตรกรยื่น ร.1 ต่อสัตวแพทย์ต้นทางก่อนเคลื่อนย้าย 3 สัปดาห์	- เกษตรกรยื่น ร.1 ต่อสัตวแพทย์ต้นทางก่อนเคลื่อนย้าย 3 สัปดาห์
	- แจ้งสัตวแพทย์พื้นที่ปลายทาง (ระบุ "การย้ายสุกรมีชีวิตเพื่อนำไปเลี้ยงจากพื้นที่ต้นทางความ	- แจ้งสัตวแพทย์พื้นที่ปลายทาง (ระบุ "การย้ายสุกรมีชีวิตเพื่อนำไปเลี้ยงจากพื้นที่ต้นทางความ	- (ต้นทาง) เก็บตัวอย่างเลือดแม่ของลูกสุกรหย่านม/สุกรสาวทดแทน
	เสี่ยงสูงมาก")	เสี่ยงสูงมาก")	15 ตัวอย่าง
	- (ต้นทาง) เก็บตัวอย่างเลือดแม่ของลูกสุกรหย่านม/สุกรสาวทดแทน 15 ตัวอย่าง	**- (ต้นทาง)** เก็บตัวอย่างเลือดแม่ของลูกสุกรหย่านม/สุกรสาวทดแทน 15 ตัวอย่าง	- ฟาร์มปลายทางไม่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับฟาร์มที่พบ
	- (ต้นทาง) เก็บ Surface Swab 1 ครั้ง (3 บริเวณ บริเวณละ 5 ตำแหน่ง)	**- (ต้นทาง)** เก็บ Surface Swab 1 ครั้ง (3 บริเวณ บริเวณละ 5 ตำแหน่ง)	ความเสี่ยงสูง ไม่ต้องใช้ผล Surface Swab ปลายทาง
	- (ปลายทาง) เก็บ Surface Swab 3 บริเวณๆ ละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง/ทุก 1 สัปดาห์	**- (ปลายทาง)** เก็บ Surface Swab 3 บริเวณๆ ละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง/ทุก 1 สัปดาห์	- ปลายทางเชื่อมโยงเก็บ Surface Swab 3 บริเวณๆ ละ 5 ตำแหน่ง
	โดยเก็บก่อนการเคลื่อนย้ายไม่เกิน 3 สัปดาห์ (ผลเป็น ลบ ทั้ง 2 ครั้ง) และแจ้งต้นทางทราบ	โดยเก็บก่อนการเคลื่อนย้ายไม่เกิน 3 สัปดาห์ (ผลเป็น ลบ ทั้ง 2 ครั้ง) และแจ้งต้นทางทราบ	จำนวน 2 ครั้ง/ทุก 1 สัปดาห์ โดยเก็บก่อนการเคลื่อนย้ายไม่เกิน
	- (ปลายทาง) หลังเคลื่อนย้าย	**- (ปลายทาง) หลังเคลื่อนย้าย**	3 สัปดาห์ (ผลเป็น ลบ ทั้ง 2 ครั้ง) และแจ้งต้นทางทราบ
		- เฝ้าระวังทางอาการ 30 วัน	**- (ปลายทาง) หลังเคลื่อนย้าย**
	- เฝ้าระวังทางอาการ 30 วัน	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุดที่เคลื่อนย้าย 5 ตัว	- เฝ้าระวังทางอาการ 30 วัน
	- เก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุดที่เคลื่อนย้าย 15 ตัว	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณๆ ละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง โดยเก็บสัปดาห์ที่ 1	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณๆ ละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2
	- เก็บ Surface Swab 3 บริเวณๆ ละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง โดยเก็บสัปดาห์ที่ 1	และ 3 หลังการเคลื่อนย้าย	ครั้ง โดยเก็บสัปดาห์ที่ 1 และ 3 หลังการเคลื่อนย้าย
	และ 3 หลังการเคลื่อนย้าย		

** ในกรณีฟาร์มปลายทางเป็นฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จะพิจารณาอนุญาตได้เมื่อมีการทำลายสุกรและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในฟาร์มไม่น้อยกว่า 3 เดือน และฟาร์มต้นทางต้องได้รับการรับรอง GAP เท่านั้น